

















## NEMI BETEGSÉGEK























Betegségek	Kötelező-vizsgálat	Diagnózis	Lehetséges betegségi tünetek
Gonorrhoe (Tripper-kankó)	Igen minden 6 hétben	Váladékvizsgálat  Vizeletvizsgálat 	 sárgás, szagos váladékozás a nemi szervből és a végbélből  fájdalom, viszketés vagy égés a vizelelkor  torokfájás orális szex után
Szifilisz (Luesz, vérbaj)	Igen minden 12 hétben	Vérvizsgálat 	 csomók és duzzanatok a nemi szervben, a száj és a végbélnyílás körül nyirokcsomó duzzanata, bőrkiütés
HIV/AIDS	Igen minden 12 hétben	Vérvizsgálat 	gyakran hosszú ideig tünetmentes
Chlamydia	Nem	Váladékvizsgálat  Vizeletvizsgálat 	 sárgás, szagos váladékozás a nemi szervből és a végbélből  fájdalom, viszketés vagy égés a vizelelkor  torokfájás orális szex után  fájdalom szex közben
Hepatitis B vagy C (ragályos májgyulladás)	Nem	Vérvizsgálat 	 gyakran tünetmentes sárgaság

### Fontos tudnivalók:

- Gonorrhoe, szifilisz oder HIV pozitív esetén az egészségi könyvet bevonják.
- Nőgyógyászati vizsgálat(ginekológus = nőgyógyász) ezen kívül szükséges! A kötelező vizsgálat nem tartalmaz pl. ráksűrűséget. Férfiaknál ezen kívül az urológiai vizsgálat (urológus) fontos. Ajánlat: legalább öt évente ellenőrzés; pl. www.docfinder.at
- Kérjük keressen fel minden betegségi tünetnél egy szakorvost!
- Ausztriában jó kezelési lehetőségek vannak e betegségek esetében.
- Egyes betegségek esetén a partnerét is kezelni kell!
- Létezik fizetendő védőoltás a Hepatitis B és a HPV ellen!Érdeklődjön orvosánál.

## FERTŐZÉS és VÉDEKEZÉS


-1-

Továbbadási útja	Lehetséges betegségek	Védekezés
Vaginális szex 	HIV, szifilisz, hepatitis B és C, gonorrhoe, chlamydia	óvszer 
Anális szex  	HIV, szifilisz, hepatitis B és C, gonorrhoe, chlamydia	óvszer 
Orális szex  	HIV, szifilisz, hepatitis B und C, gonorrhoe, chlamydia	óvszer, latex lap  
Csókolózás  	szifilisz, hepatitis B	Ne csókolózzon  
Kéz,szexjátékok  	szifilisz, gonorrhoe, chlamydia	óvszer,latex lap, latex kesztyű   
Vér 	HIV, Hepatitis B und C	óvszer, latex kesztyű, vérrel való kapcsolat kerülése   

„Szopás és nyalás“ védekezés nélkül = Fertőzés veszély!!! (z.B.: Szifilisz, HPV,...)

### Helyes óvszerhasználat:

- A pénisz merev kell legyen, amikor az óvszert ráhúzza!
- Az előbort (fitymát) hátrahúzni, az óvszer hegyét az újjávall összefogni és a péniszre helyezni
- Az óvszer hegyét összefogva tartani és az óvszert a péniszre legörgetni
- Az óvszert mindig teljesen a pénisz tövéig görgesse le
- A magömlés után azonnal vegye ki a péniszt, még mielőtt elemeyed



**Kérdés** esetén forduljon **tanácsdó helyekhez** a szexmunkások számára! Ott ingyen és bizalmasan tanácsot és támogatást kaphat. A címüket lásd a „Sexwork-Info“ füzetben! Ezt megkaphatja pl. az osztrák (kerületi-) egészségügyi hivatalokban!

Metódus	Mechanikus		Hormonos	Kémiai		Természetes
Fogamzásgátlás	♂ ○ Óvszer	♀ ○ Diafragma (pesszárium) ○ Portiosapka ○ stb.	♀ ○ Tabletta ○ Háromhavi injekció ○ Tapasz ○ Spirál ○ Hővelgyűrű ○ Implantátum	♀ ○ Rézspirál	♀ ○ Hüvelykúp ○ Krém ○ Tabletta	♀ ○ Hőmérséklet mérés ○ Nyálka módszer ○ Naptármódszer
Használata	Közvetlen a behatolás előtt a merev péniszre húzni. Véd a terhességtől és a nemi betegséggel való fertőzéstől	A nemi aktus előtt a hüvelybe, a méhnyak elé, helyezni. Megakadályozza a sperma bejutását a méhbe	Nőgyógyászoknál kapható. Hormonális változások útján megakadályozza a terhesség lehetőségét	Nőgyógyász helyezi be a méhbe. Megakadályozza a megtermékenyített petesejt beágyazódását. Az eltávolítás nőgyógyász által történik. Cserélni 3-5 évente.	A nemi aktus előtt a hüvelybe helyezni Kiöli a hímivarsejteket.	A termékeny és a nem termékeny napok kiválasztása . A termékeny napokon fontos más fogamzásgátló módszer alkalmazása: pl.óvszer.
Hogy és hol kapható?	○ Sexüzlet ○ Szupermarket ○ Drogéria ○ Gyógyszertár	○ Nőgyógyászati konzultáció ajánlott ○ Gyógyszertár	○ Nőgyógyász felkeresése elengedhetetlen	○ Nőgyógyász felkeresése elengedhetetlen	○ Gyógyszertár	
Biztonság HELYES használatnál	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
Védelem nemi betegségek ellen	IGEN	NEM	NEM	NEM	NEM	NEM

**„Esemény utáni tablettá” – csak vészhelyzetben:** Legkésőbb 72 órával a nemi aktus után kell bevenni- receptmentesen kapható a gyógyszertárakban és a nőgyógyászati ambulancián (kórházakban). Ez **nem véd** a nemi betegségektől és a HIV/ AIDS- től!

**Szivacs – menstruációs kehely – puha tampon:** **nem nyújt védelmet** sem a nemi betegségek, HIV/AIDS, **sem a** terhesség ellen!

**Kiadja:** a Prostitúció munkacsoportja az emberkereskedelem keretein belül. A tartalomért pontos feldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget. A kiadó felelősségre vonása kizárt. **Képek:** a németországi egészségügyi felvilágosítás nemzeti központjának kedves beleegyezésével és támogatásával: ([www.bzga.de](http://www.bzga.de)).