

Gonorrhoea / kankó / tripper

A gonorrhoea, kankó vagy tripper nemi úton terjedő fertőző betegség, melynek kórokozója egy baktérium.

Fertőzésre **vaginális (hüvelyi)**, **anális (végbélnyíláson keresztüli)** vagy **orális (szájon keresztüli)** nemi érintkezés útján kerülhet sor.

Tünetek:

A gonorrhoeával fertőzött nők legnagyobb része nem észlel tünetet, ha panaszok lépnek fel, azok többnyire enyhék:

fájdalom vagy égés vizeletürítéskor, folyás, periódusok közötti vérzések;

- végbéli viszketés, fájdalom, vérzések, görcsök;
- torokfájás

Szövődmények:

annak ellenére, hogy a gonorrhoea lefolyása többnyire tünetmentes, mégis felléphetnek szövődmények:

az anyaméh vagy a petevezetékek fertőződése, tályogképződés, lázzal és fájdalommal járó idült alhasi gyulladások.

Következményként méhen kívüli terhesség és meddőség léphet fel; ritkán előfordulhat vérmérgezés és ízületi gyulladások.

(Fertőzött és kezeletlen anya a szülés során megfertőzheti újszülöttjét is.)

A partner vizsgálata és esetleges kezelése elengedhetetlen.

Használjon óvszert!!

- **Kérjük, ezzel a beutalóval keresse fel azonnal a bőrgyógyászatot.**
Útleírás a másik oldalon.
- **A kezelés után hozza magával az igazolást / rendelőintézeti lapot (Ambulanzkarte).**